

# life-lac forte

Antimastítico lactación



## Composición

Cada jeringa contiene:

Amoxicilina trihidrato	0,200 g
Acido clavulánico	0,050 g
Excipientes c.s.p.	6 ml

## Características

**life-lac forte** es efectivo contra la mastitis producida por las bacterias *Streptococcus spp*, *Staphylococcus spp* y otras especies sensibles a la amoxicilina, incluyendo las cepas resistentes a la penicilina, gracias a la acción del ácido clavulánico el cual neutraliza el mecanismo de defensa de dichas bacterias.

## Indicaciones

Antibiótico intramamario para el tratamiento de la mastitis en vacas en producción.

## Dosis y modo de empleo

Hacer un ordeño a fondo antes de aplicar el producto. Aplique por vía intramamaria el contenido de una jeringa en cada uno de los cuartos afectados, previo ordeño completo y desinfección del pezón. Repetir el tratamiento con un intervalo de 12 horas hasta la remisión de los síntomas.

## Vía de administración

Intramamaria

## Registro Sanitario

Ecuador 2C3-9507-SESA-U

Guatemala 27-01-73-11,939



## Precauciones

Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños

En animales sensibles puede presentarse shock anafiláctico; en tal caso aplique adrenalina

## Tiempo de retiro

La leche producida durante el tratamiento y 3 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

Carne: 10 días

## Presentación

Caja x 4 jeringas